

臺中市性別統計通報

兩性癌症死因統計

114年8月

113年本市癌症死亡人數為5,785人，占總死亡人數28.23%；其中男性為3,399人，較104年增454人(15.42%)，女性為2,386人，增498人(26.38%)。除新社區及大安區女性標準化死亡率高於男性外，其餘皆以男性標準化死亡率較高，以外埔區男性為女性2.35倍最高，梧棲區、后里區、龍井區及大甲區亦皆逾2倍。

癌症連續多年蟬聯臺灣十大死因之首，對國人健康造成嚴重威脅。113年本市癌症死亡人數為5,785人，占總死亡人數(2萬495人)28.23%；其中男性3,399人，較104年增454人(15.42%)，女性2,386人，增498人(26.38%)，癌症死亡人數男性約為女性之1.42倍。觀察去除年齡組成影響的標準化死亡率，男性為每十萬人口145.76人，較104年減23.87人(-14.07%)，女性為85.32人，亦減12.73人(-12.98%)，近年來呈現緩降趨勢(表1)。

表1 臺中市癌症死亡概況

單位：人、人/十萬人


	死亡人數		標準化死亡率	
	男	女	男	女
104年	2,945	1,888	169.63	98.05
105年	2,916	1,961	162.59	97.27
106年	2,966	1,910	160.08	90.23
107年	3,096	2,049	161.16	92.79
108年	3,180	2,048	159.85	89.21
109年	3,264	2,165	159.46	90.14
110年	3,279	2,227	156.00	90.01
111年	3,266	2,380	150.65	92.50
112年	3,326	2,392	148.47	89.38
113年	3,399	2,386	145.76	85.32
113較112年增減數	73	-6	-2.71	-4.06
113較104年增減數	454	498	-23.87	-12.73

資料來源：衛生福利部統計處

各行政區中，113年男性癌症標準化死亡率以外埔區每十萬人口199.24人最高，大雅區172.62人次之，龍井區170.80人再次之；女性則以新社區每十萬人口133.67人最高，大安區116.14人次之，大

雅區 104.12 人再次之。除新社區及大安區女性標準化死亡率高於男性外，其餘皆以男性標準化死亡率較高，以外埔區男性為女性 2.35 倍最高，梧棲區、后里區、龍井區及大甲區亦皆逾 2 倍(圖 1)。

圖1 臺中市113年各行政區癌症標準化死亡率-按性別分



資料來源：衛生福利部統計處

備註：死亡人數未滿20人，易受小樣本影響，死亡率不具可靠性，故未提供中區女性、和平區及石岡區兩性之標準化死亡率。

以癌症類型觀之，113 年男性前三大癌症死因分別為氣管、支氣管和肺癌(每十萬人口 27.79 人)，肝和肝內膽管癌(20.91 人)及結腸、直腸和肛門癌(19.25 人)；女性亦以氣管、支氣管和肺癌(每十萬人口 13.93 人)居首，其次為女性乳癌(13.46 人)及結腸、直腸和肛門癌(11.51 人)。除了單一性別特有癌症外，口腔癌男性標準化死亡率为女性之

圖2 臺中市113年十大癌症死因標準化死亡率-按性別分



資料來源：衛生福利部統計處

14.00 倍差距最大，其餘十大癌症差距皆於 2.45 倍以下(圖 2)。

癌症初期常無明顯症狀，容易被忽視，透過定期癌症篩檢，及早發現癌前病變或初期癌症，把握黃金治療期，提高存活率。本市 114 年配合衛福部擴大癌症篩檢對象及服務，結合醫療院所及社區篩檢活動，強化癌症篩檢可近性；此外，鼓勵男性定期篩檢，以期及早發現及早治療，降低癌症威脅，一同打造健康大臺中。