

101 年臺中市兩性主要死因統計


一、兩性主要死因死亡率比較

101 年大臺中市死亡人數為 1 萬 4,960 人，其中男性 9,006 人，女性 5,954 人，粗死亡率分別為每十萬人 677.6 與 442.5 人，男性約為女性的 1.5 倍。

就十大主要死因來看，第一位為惡性腫瘤，男性死亡人數為 2,584 人，女性為 1,726 人，粗死亡率男性為每十萬人口 194.4 人，女性為每十萬人 128.3 人，男性約為女性的 1.5 倍。

主要死因中，女性僅在「腎炎、腎病症候群及腎病變」一類之粗死亡率略高於男性，糖尿病兩性相當，其餘皆低於男性，兩性差距比例最大者為慢性下呼吸道疾病，男性粗死亡率為女性之 3.9 倍。

圖 1 101 年臺中市主要死因每十萬人口死亡率



二、兩性十大死因順位比較

本市 101 年兩性主要死因，第一、二順位皆為惡性腫瘤及心臟疾病；男性第三順位為腦血管疾病，女性第三順位則為糖尿病。非疾病因素之事故傷害及蓄意自我傷害二類，男性死亡率皆高於女性，分別為男性死因第四及第十順位，女性死因分別為第八順位及第九順位。

比較兩性十大死因項目，「慢性肝病及肝硬化」進入男性十大死因；而「腎炎、腎病症候群及腎病變」則僅見於女性十大死因，其餘九類死因男女皆同。

表1 101年臺中市兩性主要死亡原因

順位	男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡百分比%	死 亡 原 因	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡百分比%
	所有死亡原因	9,006	677.6	100.0	所有死亡原因	5,954	442.5	100.0
1	惡性腫瘤	2,584	194.4	28.7	惡性腫瘤	1,726	128.3	29.0
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	861	64.8	9.6	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	600	44.6	10.1
3	腦血管疾病	632	47.6	7.0	糖尿病	481	35.7	8.1
4	事故傷害	503	37.8	5.6	腦血管疾病	439	32.6	7.4
5	慢性下呼吸道疾病	499	37.5	5.5	肺炎	287	21.3	4.8
6	糖尿病	487	36.6	5.4	高血壓性疾病	233	17.3	3.9
7	肺炎	473	35.6	5.3	腎炎、腎病症候群及腎病變	227	16.9	3.8
8	慢性肝病及肝硬化	382	28.7	4.2	事故傷害	219	16.3	3.7
9	高血壓性疾病	316	23.8	3.5	蓄意自我傷害（自殺）	138	10.3	2.3
10	蓄意自我傷害（自殺）	228	17.2	2.5	慢性下呼吸道疾病	131	9.7	2.2
	其他	2,041	153.6	22.7	其他	1,473	109.5	24.7

資料來源：本府衛生局

附註：101年年中人口數計 2,674,644 人,男性 1,329,044 人,女性 1,345,600 人。

三、兩性十大死因較上年增減率

觀察兩性 101 年主要死因較上年增減率，男性以高血壓性疾病增幅最高，達 29.35%，相對女性增幅較小為 5.03%；其次蓄意自我傷害（自殺）增加 7.49%，女性亦增加 2.89%。女性方面成長最大者為肺炎 25.93%，其次為敗血症 15.85%，腦血管疾病 6.70%再次

之。

整體而言，兩性死亡率皆呈現上升之死因有腦血管疾病、肺炎、慢性下呼吸道疾病、高血壓性疾病與蓄意自我傷害（自殺），兩性皆下降者有心臟疾病（高血壓性疾病除外）、慢性肝病及肝硬化以及腎炎、腎病症候群及腎病變等。另男性事故傷害死亡率較上年減少 3.22%，女性則增加 3.91%，惡性腫瘤方面亦為男性減少 1.48%，女性反增加 1.64%。

圖 2 101 年臺中市兩性主要死因較上年增減率

