

## 103 年臺中市十大死因分析

衛生福利部甫公布 103 年十大死因，本市死亡人數為 1 萬 5,888 人，平均 33 分 5 秒就有 1 人死亡，即每天約有 43.5 人死亡。十大死因中，惡性腫瘤(癌症)連續 33 年蟬聯十大死因之首，平均 100 名死者中，就有 30 名死於癌症。(詳表一)

表一 103年臺中市十大死因死亡時鐘

| 死亡原因             | 死亡人數   | 百分比%  | 平均每日死亡人數 | 死亡時鐘         |
|------------------|--------|-------|----------|--------------|
| 所有死亡原因           | 15,888 | 100.0 | 43.5     | 33分 5秒       |
| 1.惡性腫瘤           | 4,739  | 29.8  | 13.0     | 1小時 50分 54秒  |
| 2.心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 1,536  | 9.7   | 4.2      | 5小時 42分 11秒  |
| 3.腦血管疾病          | 1,113  | 7.0   | 3.0      | 7小時 52分 14秒  |
| 4.糖尿病            | 1,030  | 6.5   | 2.8      | 8小時 30分 17秒  |
| 5.肺炎             | 839    | 5.3   | 2.3      | 10小時 26分 27秒 |
| 6.事故傷害           | 766    | 4.8   | 2.1      | 11小時 26分 9秒  |
| 7.慢性下呼吸道疾病       | 617    | 3.9   | 1.7      | 14小時 11分 51秒 |
| 8.高血壓性疾病         | 585    | 3.7   | 1.6      | 14小時 58分 27秒 |
| 9.腎炎、腎病症候群及腎病變   | 507    | 3.2   | 1.4      | 17小時 16分 41秒 |
| 10.慢性肝病及肝硬化      | 486    | 3.1   | 1.3      | 18小時 1分 28秒  |

資料來源：衛生福利部

### 一、死亡人數及標準化死亡率<sup>1</sup>

#### (一)標準化死亡率緩緩上升

103 年本市死亡人數為 1 萬 5,888 人，較上年增加 5.92%，經標準化後，死亡率為每十萬人 441.9 人，較上年增加 7.8 人；其中男性 9,568 人，標準化死亡率為每十萬人 558.1 人；女性 6,320 人，標準化死亡率為每十萬人 335.8 人；與 102 年相較，男性標準化死亡率每十萬人增加 14.4 人，女性每十萬人則增加 2.1 人，均有緩緩上升之勢。(詳表二)

<sup>1</sup>標準化死亡率指各年齡別死亡率乘以標準人口的比率總和，化成為同一的基礎，俾可受到客觀的比較。

表二 臺中市死亡人數及標準化死亡率

| 年別           | 死亡人數(人) |       |       | 標準化死亡率(人/十萬人) |       |       |
|--------------|---------|-------|-------|---------------|-------|-------|
|              | 合計      | 男     | 女     | 合計            | 男     | 女     |
| 100年         | 14,893  | 9,052 | 5,841 | 471.6         | 587.4 | 363.9 |
| 101年         | 14,960  | 9,006 | 5,954 | 453.7         | 564.7 | 350.8 |
| 102年         | 15,000  | 9,012 | 5,988 | 434.1         | 543.7 | 333.7 |
| 103年         | 15,888  | 9,568 | 6,320 | 441.9         | 558.1 | 335.8 |
| 103年較102年增減數 | 888     | 556   | 332   | 7.8           | 14.4  | 2.1   |
| 103年較102年增減% | 5.92    | 6.17  | 5.54  | --            | --    | --    |

資料來源：衛生福利部

附註：標準化死亡率指各年齡別死亡率乘以標準人口的比率總和，因此男、女標準化死亡率相加不等於標準化死亡率合計。

## (二)標準化死亡率與全國平均相當

觀察 103 年六都標準化死亡率，以臺北市每十萬人 332.5 人最低，新北市及桃園市每十萬人 408.6 人、437.2 人次低，本市每十萬人 441.9 人居第四，與全國每十萬人 443.6 人相當，而高雄市每十萬人 483.6 人最高。

進一步觀察標準化死亡率增減情形，除臺南市每十萬人減少 4.0 人外，其餘五都皆較 102 年增加，其中以桃園市每十萬人增加 19.7 人最多，本市則為每十萬人增加 7.8 人。(詳表三)

表三 全國及六都標準化死亡率

單位：人/十萬人

| 年別           | 全國    | 新北市   | 臺北市   | 桃園市   | 臺中市   | 臺南市   | 高雄市   |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 100年         | 462.4 | 423.4 | 343.5 | 450.2 | 471.6 | 496.6 | 499.9 |
| 101年         | 450.6 | 415.0 | 344.3 | 437.0 | 453.7 | 476.0 | 487.6 |
| 102年         | 435.3 | 402.5 | 326.3 | 417.5 | 434.1 | 461.2 | 473.7 |
| 103年         | 443.6 | 408.6 | 332.5 | 437.2 | 441.9 | 457.2 | 483.6 |
| 103年較102年增減數 | 8.3   | 6.1   | 6.2   | 19.7  | 7.8   | -4.0  | 9.9   |

資料來源：衛生福利部

## 二、十大死因

### (一)惡性腫瘤連續 33 年蟬聯十大死因之首

本市 103 年十大死因死亡人數，占總死亡人數的 76.9%，其中惡性腫瘤(癌症)連續 33 年蟬聯十大死因之首，且遠高於第二位心臟疾病，依序為(1)惡性腫瘤(占 29.8%)；(2)心臟疾病(高血壓性疾病除外)(9.7%)；(3)腦血管疾病(7.0%)；(4)糖尿病(6.5%)；(5)肺炎(5.3%)；(6)事故傷害(4.8%)；(7)慢性下呼吸道疾病(3.9%)；(8)高血壓性疾病(3.7%)；(9)腎炎、腎病症候群及腎病變(3.2%)；(10)慢性肝病及肝硬化(3.1%)。(詳表四)


相較於 102 年，十大死因項目相同，惟「肺炎」由第 6 名上升一個順位，「事故傷害」由第 5 名下降一個順位。(詳表五)

### (二)男性十大死因死亡人數及死亡率約為女性的 1.5 倍

按性別觀察，本市 103 年男性十大死因死亡人數 9,568 人，每十萬人死亡率 712.2 人；女性十大死因死亡人數 6,320 人，每十萬人死亡率 462.2 人；均呈現男高於女，男性約為女性 1.5 倍。(詳表四)

比較兩性十大死因項目，今年十大死因男女皆同，第一、二順位皆為惡性腫瘤及心臟疾病；第三順位男性為腦血管疾病，女性則為糖尿病。非疾病因素之事故傷害，男性死亡率高於女性，分別為男性死因第四順位，女性第八順位；另蓄意自我傷害(自殺)，不在兩性十大死因項目中，排到第十一位。(詳圖一)

圖一 臺中市103年兩性十大死因死亡率



資料來源：衛生福利部

### 三、惡性腫瘤(癌症)

#### (一)肺癌、肝癌續居主要癌症死因前 2 名

本市 103 年十大癌症死因死亡人數，占總癌症死亡人數的 76.5%，依序為(1)氣管、支氣管和肺癌(占 18.6%)；(2)肝和肝內膽管癌(17.3%)；(3)結腸、直腸和肛門癌(11.9%)；(4)女性乳房癌(5.8%)；(5)口腔癌(5.7%)；(6)前列腺(攝護腺)癌(2.6%)；(7)胃癌(4.9%)；(8)食道癌(4.3%)；(9)胰臟癌(3.9%)；(10)子宮頸及部位未明示子宮癌(1.5%)。(詳表六)


相較於 102 年，十大癌症死因項目相同，惟「食道癌」由第 9 名上升一個順位，「胰臟癌」由第 8 名下降一個順位。(詳表七)

#### (二)平均 1.8 小時就有 1 人死於癌症，且男性約為女性的 1.5 倍

本市 103 年惡性腫瘤(癌症)死亡人數為 4,739 人，死亡率每十萬人 174.8 人，平均 1.8 小時就有 1 人死於癌症。其中男性死亡人數 2,867 人，死亡率每十萬人 213.4 人；女性死亡人數 1,872 人，死亡率每十萬人 136.9 人；均呈現男高於女，且男性約為女性 1.5 倍。(詳表六)

男性死亡率以肝和肝內膽管癌每十萬人 41.2 人最高，氣管、支氣管和肺癌 40.9 人次之；女性死亡率以氣管、支氣管和肺癌每十萬人 24.2 人最高，女性乳房癌 20.1 人次之，而結腸、直腸和肛門癌分別居男性第三位、女性第四位。(詳圖二)

圖二 臺中市103年兩性主要癌症死亡率



資料來源：衛生福利部

#### **四、癌症篩檢**

##### **(一)乳癌篩檢率居六都之末，大腸癌篩檢率僅高於臺北市**

為降低癌症死亡率，政府提供主要癌症(乳癌、子宮頸癌、大腸癌及口腔癌)篩檢服務，觀察本市四項癌症篩檢情形，其中 101-102 年 30 歲以上嚼檳榔或吸菸者最近兩年內接受口腔癌篩檢率，本市 56.8%居六都之冠；100-102 年 30-69 歲以上婦女最近三年內曾經接受過子宮頸抹片篩檢率，本市 58.5%六都中排名第三，略低於新北市 59.4%及桃園市 58.7%；101-102 年 50-69 歲民眾最近兩年內曾經接受過糞便潛血檢查篩檢率，本市 37.5%六都中排名第五，僅高於臺北市 34.0%；101-102 年 45-69 歲婦女最近兩年內接受乳癌篩檢率，本市 33.7%居六都之末，亦低於全國 36.0%。(詳表八)

##### **(二)口腔癌及子宮頸癌篩檢率高，有助死亡人數減少**

本市篩檢率不到四成的乳癌及大腸癌，103 年死亡人數分別為 275 人及 563 人，分別較 102 年增加 33 人(13.6%)及 42 人(8.1%);而篩檢率接近六成的口腔癌及子宮頸癌，103 年死亡人數分別為 270 人及 70 人，分別較 102 年減少 28 人(-9.4%)及 0 人。由此可知，癌症篩檢可以早期發現癌症或其癌前病變，經治療後除了可以降低死亡率，還可以阻斷癌前病變進展為癌症。(詳表七、表八)

表四 臺中市主要死亡原因

民國103年

| 順位 | 合 計                                                  |                     |          |              |            |                | 男 性                                                  |                     |          |              |            |                | 女 性                                                  |                     |          |              |            |                |
|----|------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------------|------------|----------------|------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------------|------------|----------------|------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------------|------------|----------------|
|    | ICD-10<br>國際死因<br>分類號碼                               | 死 亡 原 因             | 死亡<br>人數 | 每十萬人口<br>死亡率 | 標準化<br>死亡率 | 死亡<br>百分比<br>% | ICD-10<br>國際死因<br>分類號碼                               | 死 亡 原 因             | 死亡<br>人數 | 每十萬人口<br>死亡率 | 標準化<br>死亡率 | 死亡<br>百分比<br>% | ICD-10<br>國際死因<br>分類號碼                               | 死 亡 原 因             | 死亡<br>人數 | 每十萬人口<br>死亡率 | 標準化<br>死亡率 | 死亡<br>百分比<br>% |
|    |                                                      |                     |          |              |            |                |                                                      |                     |          |              |            |                |                                                      |                     |          |              |            |                |
| 1  | A00-Y98                                              | 所有死亡原因              | 15,888   | 586.1        | 441.9      | 100.0          | A00-Y98                                              | 所有死亡原因              | 9,568    | 712.2        | 558.1      | 100.0          | A00-Y98                                              | 所有死亡原因              | 6,320    | 462.2        | 335.8      | 100.0          |
| 2  | C00-C97                                              | 惡性腫瘤                | 4,739    | 174.8        | 133.7      | 29.8           | C00-C97                                              | 惡性腫瘤                | 2,867    | 213.4        | 169.4      | 30.0           | C00-C97                                              | 惡性腫瘤                | 1,872    | 136.9        | 101.1      | 29.6           |
| 3  | I01-I02.0,<br>I05-I09, I20-<br>I25, I27, I30-<br>I52 | 心臟疾病（高血壓性疾<br>病除外）  | 1,536    | 56.7         | 41.5       | 9.7            | I01-I02.0,<br>I05-I09, I20-<br>I25, I27, I30-<br>I52 | 心臟疾病（高血壓性疾<br>病除外）  | 914      | 68.0         | 52.1       | 9.6            | I01-I02.0,<br>I05-I09, I20-<br>I25, I27, I30-<br>I52 | 心臟疾病（高血壓性疾<br>病除外）  | 622      | 45.5         | 31.8       | 9.8            |
| 4  | I60-I69                                              | 腦血管疾病               | 1,113    | 41.1         | 30.2       | 7.0            | I60-I69                                              | 腦血管疾病               | 691      | 51.4         | 39.6       | 7.2            | E10-E14                                              | 糖尿病                 | 512      | 37.4         | 26.9       | 8.1            |
| 5  | E10-E14                                              | 糖尿病                 | 1,030    | 38.0         | 28.5       | 6.5            | V01-X59,<br>Y85-Y86                                  | 事故傷害                | 572      | 42.6         | 36.1       | 6.0            | I60-I69                                              | 腦血管疾病               | 422      | 30.9         | 21.7       | 6.7            |
| 6  | J12-J18                                              | 肺炎                  | 839      | 31.0         | 21.8       | 5.3            | J12-J18                                              | 肺炎                  | 526      | 39.2         | 28.6       | 5.5            | J12-J18                                              | 肺炎                  | 313      | 22.9         | 15.6       | 5.0            |
| 7  | V01-X59,<br>Y85-Y86                                  | 事故傷害                | 766      | 28.3         | 23.5       | 4.8            | E10-E14                                              | 糖尿病                 | 518      | 38.6         | 30.4       | 5.4            | I10-I15                                              | 高血壓性疾病              | 282      | 20.6         | 14.2       | 4.5            |
| 8  | J40-J47                                              | 慢性下呼吸道疾病            | 617      | 22.8         | 15.8       | 3.9            | J40-J47                                              | 慢性下呼吸道疾病            | 476      | 35.4         | 25.3       | 5.0            | N00-N07,<br>N17-N19,<br>N25-N27                      | 腎炎、腎病症候群及腎<br>病變    | 244      | 17.8         | 12.5       | 3.9            |
| 9  | I10-I15                                              | 高血壓性疾病              | 585      | 21.6         | 15.3       | 3.7            | K70, K73-<br>K74                                     | 慢性肝病及肝硬化            | 343      | 25.5         | 20.2       | 3.6            | V01-X59,<br>Y85-Y86                                  | 事故傷害                | 194      | 14.2         | 11.7       | 3.1            |
| 10 | N00-N07,<br>N17-N19,<br>N25-N27                      | 腎炎、腎病症候群及腎<br>病變    | 507      | 18.7         | 13.7       | 3.2            | I10-I15                                              | 高血壓性疾病              | 303      | 22.6         | 16.6       | 3.2            | K70, K73-<br>K74                                     | 慢性肝病及肝硬化            | 143      | 10.5         | 7.8        | 2.3            |
| 11 | K70, K73-<br>K74                                     | 慢性肝病及肝硬化            | 486      | 17.9         | 13.8       | 3.1            | N00-N07,<br>N17-N19,<br>N25-N27                      | 腎炎、腎病症候群及腎<br>病變    | 263      | 19.6         | 15.2       | 2.7            | J40-J47                                              | 慢性下呼吸道疾病            | 141      | 10.3         | 7.0        | 2.2            |
| 12 |                                                      | 其他                  | 3,670    | 135.4        | 104.2      | 23.1           |                                                      | 其他                  | 2,095    | 156.0        | 124.6      | 21.9           |                                                      | 其他                  | 1,575    | 115.2        | 85.7       | 24.9           |
| 13 | X60-X84,<br>Y87.0                                    | 蓄意自我傷害（自殺）          | 382      | 14.1         | 11.5       | 2.4            | X60-X84,<br>Y87.0                                    | 蓄意自我傷害（自殺）          | 247      | 18.4         | 15.1       | 2.6            | X60-X84,<br>Y87.0                                    | 蓄意自我傷害（自殺）          | 135      | 9.9          | 8.2        | 2.1            |
| 14 | A40-A41                                              | 敗血症                 | 275      | 10.1         | 7.3        | 1.7            | A40-A41                                              | 敗血症                 | 156      | 11.6         | 8.8        | 1.6            | A40-A41                                              | 敗血症                 | 119      | 8.7          | 6.0        | 1.9            |
| 15 | R54                                                  | 衰老/老邁               | 146      | 5.4          | 3.4        | 0.9            | D00-D48                                              | 原位與良性腫瘤（惡性<br>腫瘤除外） | 69       | 5.1          | 4.1        | 0.7            | R54                                                  | 衰老/老邁               | 84       | 6.1          | 3.8        | 1.3            |
| 16 | D00-D48                                              | 原位與良性腫瘤（惡性<br>腫瘤除外） | 135      | 5.0          | 3.7        | 0.8            | M00-M99                                              | 骨骼肌肉系統及結締組<br>織之疾病  | 65       | 4.8          | 3.6        | 0.7            | M00-M99                                              | 骨骼肌肉系統及結締組<br>織之疾病  | 69       | 5.0          | 3.8        | 1.1            |
| 17 | M00-M99                                              | 骨骼肌肉系統及結締組<br>織之疾病  | 134      | 4.9          | 3.7        | 0.8            | R54                                                  | 衰老/老邁               | 62       | 4.6          | 2.9        | 0.6            | D00-D48                                              | 原位與良性腫瘤（惡性<br>腫瘤除外） | 66       | 4.8          | 3.4        | 1.0            |

資料來源：衛生福利部

附註：1. 103年年中人口數計 271萬748人,男性 134萬3,372人,女性 136萬7,377人。

表五 臺中市103年與102年主要死因比較

| 順位 | 死 亡 原 因         | 103年        |                 |            | 102年        |                 |            |    |      |
|----|-----------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|------------|----|------|
|    |                 | 死亡人數<br>(人) | 粗死亡率<br>(人/十萬人) | 百分比<br>(%) | 死亡人數<br>(人) | 粗死亡率<br>(人/十萬人) | 百分比<br>(%) | 順位 | 順位變化 |
|    | 所有死亡原因          | 15,888      | 586.1           | 100.0      | 15,000      | 556.9           | 100.0      |    |      |
| 1  | 惡性腫瘤            | 4,739       | 174.8           | 29.8       | 4,613       | 171.3           | 30.8       | 1  | —    |
| 2  | 心臟疾病（高血壓性疾病除外）  | 1,536       | 56.7            | 9.7        | 1,553       | 57.7            | 10.4       | 2  | —    |
| 3  | 腦血管疾病           | 1,113       | 41.1            | 7.0        | 1,079       | 40.1            | 7.2        | 3  | —    |
| 4  | 糖尿病             | 1,030       | 38.0            | 6.5        | 953         | 35.4            | 6.4        | 4  | —    |
| 5  | 肺炎              | 839         | 31.0            | 5.3        | 700         | 26.0            | 4.7        | 6  | 1↑   |
| 6  | 事故傷害            | 766         | 28.3            | 4.8        | 731         | 27.1            | 4.9        | 5  | 1▼   |
| 7  | 慢性下呼吸道疾病        | 617         | 22.8            | 3.9        | 614         | 22.8            | 4.1        | 7  | —    |
| 8  | 高血壓性疾病          | 585         | 21.6            | 3.7        | 593         | 22.0            | 4.0        | 8  | —    |
| 9  | 腎炎、腎病症候群及腎病變    | 507         | 18.7            | 3.2        | 463         | 17.2            | 3.1        | 9  | —    |
| 10 | 慢性肝病及肝硬化        | 486         | 17.9            | 3.1        | 458         | 17.0            | 3.1        | 10 | —    |
|    | 其他              | 3,670       | 135.4           | 23.1       | 3,243       | 120.4           | 21.6       |    |      |
| 11 | 蓄意自我傷害（自殺）      | 382         | 14.1            | 2.4        | 340         | 12.6            | 2.3        | 11 | —    |
| 12 | 敗血症             | 275         | 10.1            | 1.7        | 229         | 8.5             | 1.5        | 12 | —    |
| 13 | 衰老/老邁           | 146         | 5.4             | 0.9        | 131         | 4.9             | 0.9        | 13 | —    |
| 14 | 原位與良性腫瘤（惡性腫瘤除外） | 135         | 5.0             | 0.8        | 124         | 4.6             | 0.8        | 14 | —    |
| 15 | 骨骼肌肉系統及結締組織之疾病  | 134         | 4.9             | 0.8        | 115         | 4.3             | 0.8        | 15 | —    |

資料來源：衛生福利部

附註：1. 103年年中人口數計 271萬748人。

2. 102年年中人口數計 269萬3,277人。

表六 臺中市主要癌症死亡原因

民國103年

| 順位 | 合 計                    |                  |          |       |            |                | 男 性                    |           |          |       |            |                | 女 性                    |                  |          |       |            |                |
|----|------------------------|------------------|----------|-------|------------|----------------|------------------------|-----------|----------|-------|------------|----------------|------------------------|------------------|----------|-------|------------|----------------|
|    | ICD-10<br>國際死因<br>分類號碼 | 死 亡 原 因          | 死亡<br>人數 | 每十萬人口 |            | 死亡<br>百分比<br>% | ICD-10<br>國際死因<br>分類號碼 | 死 亡 原 因   | 死亡<br>人數 | 每十萬人口 |            | 死亡<br>百分比<br>% | ICD-10<br>國際死因<br>分類號碼 | 死 亡 原 因          | 死亡<br>人數 | 每十萬人口 |            | 死亡<br>百分比<br>% |
|    |                        |                  |          | 死亡率   | 標準化<br>死亡率 |                |                        |           |          | 死亡率   | 標準化<br>死亡率 |                |                        |                  |          | 死亡率   | 標準化<br>死亡率 |                |
| 1  | C00-C97                | 惡性腫瘤             | 4,739    | 174.8 | 133.7      | 100.0          | C00-C97                | 惡性腫瘤      | 2,867    | 213.4 | 169.4      | 100.0          | C00-C97                | 惡性腫瘤             | 1,872    | 136.9 | 101.1      | 100.0          |
| 2  | C33-C34                | 氣管、支氣管和肺癌        | 880      | 32.5  | 24.6       | 18.6           | C22                    | 肝和肝內膽管癌   | 554      | 41.2  | 33.3       | 19.3           | C33-C34                | 氣管、支氣管和肺癌        | 331      | 24.2  | 17.7       | 17.7           |
| 3  | C22                    | 肝和肝內膽管癌          | 822      | 30.3  | 23.7       | 17.3           | C33-C34                | 氣管、支氣管和肺癌 | 549      | 40.9  | 32.4       | 19.1           | C50                    | 女性乳房癌            | 275      | 20.1  | 14.8       | 14.7           |
| 4  | C18-C21                | 結腸、直腸和肛門癌        | 563      | 20.8  | 15.8       | 11.9           | C18-C21                | 結腸、直腸和肛門癌 | 307      | 22.9  | 18.2       | 10.7           | C22                    | 肝和肝內膽管癌          | 268      | 19.6  | 14.9       | 14.3           |
| 5  | C50                    | 女性乳房癌            | 275      | 20.1  | 14.8 (1)   | 5.8            | C00-C06,<br>C09-C10,   | 口腔癌       | 257      | 19.1  | 15.2       | 9.0            | C18-C21                | 結腸、直腸和肛門癌        | 256      | 18.7  | 13.6       | 13.7           |
| 6  | C00-C06,<br>C09-C10,   | 口腔癌              | 270      | 10.0  | 7.6        | 5.7            | C15                    | 食道癌       | 188      | 14.0  | 10.8       | 6.6            | C25                    | 胰臟癌              | 89       | 6.5   | 4.7        | 4.8            |
| 7  | C61                    | 前列腺(攝護腺)癌        | 121      | 9.0   | 6.8 (2)    | 2.6            | C16                    | 胃癌        | 157      | 11.7  | 9.1        | 5.5            | C16                    | 胃癌               | 76       | 5.6   | 4.0        | 4.1            |
| 8  | C16                    | 胃癌               | 233      | 8.6   | 6.4        | 4.9            | C61                    | 前列腺(攝護腺)癌 | 121      | 9.0   | 6.8        | 4.2            | C53, C55               | 子宮頸及部位未明示<br>子宮癌 | 70       | 5.1   | 3.7        | 3.7            |
| 9  | C15                    | 食道癌              | 204      | 7.5   | 5.6        | 4.3            | C25                    | 胰臟癌       | 96       | 7.1   | 5.7        | 3.3            | C56, C57.0-<br>C57.4   | 卵巢癌              | 67       | 4.9   | 3.7        | 3.6            |
| 10 | C25                    | 胰臟癌              | 185      | 6.8   | 5.2        | 3.9            | C67                    | 膀胱癌       | 69       | 5.1   | 3.9        | 2.4            | C91-C95                | 白血病              | 49       | 3.6   | 2.8        | 2.6            |
| 11 | C53, C55               | 子宮頸及部位未明示<br>子宮癌 | 70       | 5.1   | 3.7 (1)    | 1.5            | C82-C85                | 非何杰金氏淋巴瘤  | 63       | 4.7   | 3.8        | 2.2            | C82-C85                | 非何杰金氏淋巴瘤         | 46       | 3.4   | 2.5        | 2.5            |
| 12 |                        | 其他               | 1,116    | 41.2  | 31.8       | 23.5           |                        | 其他        | 506      | 37.7  | 30.2       | 17.6           |                        | 其他               | 345      | 25.2  | 18.7       | 18.4           |
| 13 | C56, C57.0-<br>C57.4   | 卵巢癌              | 67       | 4.9   | 3.7 (1)    | 1.4            | C11                    | 鼻咽癌       | 59       | 4.4   | 3.6        | 2.1            | C54                    | 子宮體癌             | 37       | 2.7   | 1.9        | 2.0            |
| 14 | C82-C85                | 非何杰金氏淋巴瘤         | 109      | 4.0   | 3.2        | 2.3            | C91-C95                | 白血病       | 56       | 4.2   | 3.4        | 2.0            | C23-C24                | 膽囊和其他膽道癌         | 29       | 2.1   | 1.6        | 1.5            |
| 15 | C91-C95                | 白血病              | 105      | 3.9   | 3.1        | 2.2            | C71                    | 腦癌        | 38       | 2.8   | 2.5        | 1.3            | C64                    | 腎臟癌              | 29       | 2.1   | 1.6        | 1.5            |
| 16 | C67                    | 膀胱癌              | 96       | 3.5   | 2.6        | 2.0            | C64                    | 腎臟癌       | 34       | 2.5   | 2.0        | 1.2            | C71                    | 腦癌               | 29       | 2.1   | 1.7        | 1.5            |
| 17 | C54                    | 子宮體癌             | 37       | 2.7   | 1.9 (1)    | 0.8            | C23-C24                | 膽囊和其他膽道癌  | 28       | 2.1   | 1.6        | 1.0            | C67                    | 膀胱癌              | 27       | 2.0   | 1.4        | 1.4            |

資料來源：衛生福利部

附註：1. 103年年中人口數計 271萬748 人,男性 134萬3,372 人,女性 136萬7,377 人。

2. (1)每十萬女性人口死亡率。

(2)每十萬男性人口死亡率。

表七 臺中市103年與102年主要癌症死因比較

| 順位 | 癌症死亡原因       | 103年        |                 |            | 102年        |                 |            |    |      |
|----|--------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|------------|----|------|
|    |              | 死亡人數<br>(人) | 粗死亡率<br>(人/十萬人) | 百分比<br>(%) | 死亡人數<br>(人) | 粗死亡率<br>(人/十萬人) | 百分比<br>(%) | 順位 | 順位變化 |
|    | 惡性腫瘤         | 4,739       | 174.8           | 100.0      | 4,613       | 171.3           | 100.0      |    |      |
| 1  | 氣管、支氣管和肺癌    | 880         | 32.5            | 18.6       | 870         | 32.3            | 18.9       | 1  | —    |
| 2  | 肝和肝內膽管癌      | 822         | 30.3            | 17.3       | 821         | 30.5            | 17.8       | 2  | —    |
| 3  | 結腸、直腸和肛門癌    | 563         | 20.8            | 11.9       | 521         | 19.3            | 11.3       | 3  | —    |
| 4  | 女性乳房癌        | 275         | 20.1            | 5.8        | 242         | 17.8 (1)        | 5.2        | 4  | —    |
| 5  | 口腔癌          | 270         | 10.0            | 5.7        | 298         | 11.1            | 6.5        | 5  | —    |
| 6  | 前列腺(攝護腺)癌    | 121         | 9.0             | 2.6        | 144         | 10.8 (2)        | 3.1        | 6  | —    |
| 7  | 胃癌           | 233         | 8.6             | 4.9        | 201         | 7.5             | 4.4        | 7  | —    |
| 8  | 食道癌          | 204         | 7.5             | 4.3        | 183         | 6.8             | 4.0        | 9  | 1 ↑  |
| 9  | 胰臟癌          | 185         | 6.8             | 3.9        | 192         | 7.1             | 4.2        | 8  | 1 ▼  |
| 10 | 子宮頸及部位未明示子宮癌 | 70          | 5.1             | 1.5        | 70          | 5.2 (1)         | 1.5        | 10 | —    |
|    | 其他           | 1,116       | 41.2            | 23.5       | 1,071       | 39.8            | 23.2       |    |      |
| 11 | 卵巢癌          | 67          | 4.9             | 1.4        | 66          | 4.9 (1)         | 1.4        | 11 | —    |
| 12 | 非何杰金氏淋巴瘤     | 109         | 4.0             | 2.3        | 118         | 4.4             | 2.6        | 12 | —    |
| 13 | 白血病          | 105         | 3.9             | 2.2        | 108         | 4.0             | 2.3        | 13 | —    |
| 14 | 膀胱癌          | 96          | 3.5             | 2.0        | 82          | 3.0             | 1.8        | 14 | —    |
| 15 | 子宮體癌         | 37          | 2.7             | 0.8        |             |                 |            |    |      |

資料來源：衛生福利部

附註：1. 103年年中人口數計 271萬748 人,男性 134萬3,372 人,女性 136萬7,377 人。

2. 102年年中人口數計 269萬3,277 人,男性 133萬6,464 人,女性 135萬6,814 人。

3. (1)每十萬女性人口死亡率。

(2)每十萬男性人口死亡率。

表八 六都主要癌症篩檢率

單位%

| 項目別                                    | 全國   | 新北市  | 臺北市  | 桃園市  | 臺中市  | 臺南市  | 高雄市  |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 45-69歲婦女最近兩年內接受乳癌篩檢率(101-102年)         | 36.0 | 36.4 | 34.8 | 37.7 | 33.7 | 35.6 | 35.0 |
| 30-69歲以上婦女最近三年內曾經接受過子宮頸抹片篩檢率(100-102年) | 57.1 | 59.4 | 53.5 | 58.7 | 58.5 | 57.5 | 56.0 |
| 50-69歲民眾最近兩年內曾經接受大腸癌篩檢率(101-102年)      | 38.2 | 40.3 | 34.0 | 41.8 | 37.5 | 37.6 | 39.3 |
| 30歲以上嚼檳榔或吸菸者最近兩年內接受口腔癌篩檢率(101-102年)    | 54.0 | 54.4 | 45.3 | 55.4 | 56.8 | 52.1 | 52.9 |

資料來源:國民健康署-102年健康促進統計年報