

主計處統計通報

第 100-012 號

100 年 10 月

99 年大臺中市兩性主要死因統計


一、兩性主要死因死亡率比較

99 年大臺中市死亡人數為 1 萬 4,220 人，其中男性 8,703 人，女性 5,517 人，粗死亡率分別為每十萬人 660.7 與 416.4 人，男性約為女性的 1.6 倍。

就十大主要死因來看，第一位為惡性腫瘤，男性死亡人數為 2,574 人，女性為 1,515 人，粗死亡率男性為每十萬人口 195.4 人，女性為每十萬人 114.3 人，男性約為女性的 1.7 倍。

主要死因中，女性僅在糖尿病及衰老/老邁類二類之粗死亡率高於男性，其餘皆低於男性，兩性差距比例最大者為慢性下呼吸道疾病，男性粗死亡率為女性之 3.7 倍。

圖 1 99 年大臺中市主要死因每十萬人口死亡率



資料來源：行政院衛生署

二、兩性主要死因順位比較

本市 99 年兩性主要死因，第一、二順位皆為惡性腫瘤及心臟疾病；男性第三順位為腦血管疾病，女性第三順位則為糖尿病。非疾病因素之事故傷害及蓄意自我傷害二類，男性死亡率皆高於女性，分別為男性死因第四及第九順位，事故傷害為女性死因第七順位，蓄意自我傷害則未進入女性十大死因。

比較兩性十大死因項目，慢性下呼吸道疾病及蓄意自我傷害進入男性十大死因；而高血壓性疾病與敗血症則僅見於女性十大死因，其餘八類死因男女皆同。

表 1 99 年大臺中市兩性主要死亡原因

順位	男 性				女 性			
	死亡原因	死亡人數	粗死亡率	死 亡 百分比%	死亡原因	死亡人數	粗死亡率	死 亡 百分比%
	所有死亡原因	8,703	660.7	100.0	所有死亡原因	5,517	416.4	100.0
1	惡性腫瘤	2,574	195.4	29.6	惡性腫瘤	1,515	114.3	27.5
2	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	789	59.9	9.1	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）	598	45.1	10.8
3	腦血管疾病	597	45.3	6.9	糖尿病	466	35.2	8.4
4	事故傷害	520	39.5	6.0	腦血管疾病	386	29.1	7.0
5	肺炎	459	34.8	5.3	腎炎、腎病症候群 及腎病變	230	17.4	4.2
6	慢性下呼吸道疾病	439	33.3	5.0	肺炎	229	17.3	4.2
7	糖尿病	397	30.1	4.6	事故傷害	207	15.6	3.8
8	慢性肝病及肝硬化	363	27.6	4.2	高血壓性疾病	188	14.2	3.4
9	蓄意自我傷害（自 殺）	255	19.4	2.9	敗血症	164	12.4	3.0
10	腎炎、腎病症候群 及腎病變	232	17.6	2.7	慢性肝病及肝硬化	147	11.1	2.7
	其他	2,078	157.8	23.9	其他	1,387	104.7	25.1

資料來源：行政院衛生署