

# 主計處統計通報

第 100-005 號

100 年 6 月

## 大臺中市 99 年十大死因統計

### 一、整體死亡率略微上升，惡性腫瘤續居死因之首，平均每 37 分鐘有一位市民死亡

大臺中市 99 年死亡人數為 14,220 人，較上年增加 525 人，粗死亡率為每十萬人口 538.2 人，較上年增加 17.5 人，平均每 37 分鐘有一位市民死亡。

99 年十大死因死亡人數占總死亡人數 7 成 5，依序為(1)惡性腫瘤、(2)心臟疾病(高血壓性疾病除外)、(3)腦血管疾病、(4)糖尿病、(5)事故傷害、(6)肺炎、(7)慢性下呼吸道疾病、(8)慢性肝病及肝硬化、(9)腎炎、腎病症候群及腎病變、(10)高血壓性疾病。與 98 年比較，前六名仍持平，慢性下呼吸道疾病上升 1 個名次至第 7 位，慢性肝病及肝硬化則下降 1 個名次至第 8 位，腎炎腎病症候群及腎病變持平，高血壓性疾病上升 1 個名次，擠進前十名，而蓄意自我傷害(自殺)則首度退出十大死因之列。

99 年十大死因中，粗死亡率較 98 年上升者計有惡性腫瘤(上升幅度 1.2%)、心臟疾病(高血壓性疾病除外)(6.9%)、糖尿病(2.9%)、肺炎(14.5%)、慢性下呼吸道疾病(20.3%)、腎炎腎病症候群及腎病變(12.1%)、高血壓性疾病(4.8%)，餘則略微下降 3~4% 左右。

### 二、肝癌、肺癌續居主要癌症死因前二位，平均每 2.1 小時有一位市民因癌症死亡

就癌症觀之，99 年癌症死亡人數為 4,089 人，占有所有死亡人數的 28.8%，平均每 2.1 小時就有一位市民因癌症死亡。粗死亡率為每十萬人口 154.8 人，較上年增加 1.2 人。

如依各癌症死亡率排序，其前十位依序為(1)肝和肝內膽管癌、(2)

氣管、支氣管和肺癌、(3) 結腸、直腸和肛門癌、(4)女性乳房癌、(5) 口腔癌、(6)胃癌、(7)前列腺(攝護腺)癌、(8)食道癌、(9) 子宮頸癌及部分未明示子宮癌、(10)胰臟癌。與 98 年比較，十大癌症死因內容相同，口腔癌及子宮頸癌皆上升一個名次，胃癌及胰臟癌皆下降一個名次，其餘順位不變。

十大癌症粗死亡率與上年相較增加 1.2%，就內容來看，以口腔癌增加幅度 9.46% 為最，女性乳房癌 7.25% 次之，顯示民眾嚼食檳榔及抽菸之生活習慣影響健康甚鉅，且女性民眾大多仍未有乳房自我檢測及定期篩檢之習慣，可多加強推廣乳癌防治教育；另氣管支氣管和肺癌、肝和肝內膽管癌、食道癌、結腸直腸和肛門癌、前列腺(攝護腺)癌亦略微上升；子宮頸及部分未明示子宮癌則持平；胃癌、胰臟癌則分別下降 11.54% 及 10.53%，顯示國人對健康飲食日漸重視。

### **三、促進銀髮族老人健康及建立民眾正確醫藥觀念，增進個人與社會健康度**

綜觀十大死因中粗死亡率上升幅度較大者有慢性下呼吸道疾病、肺炎、腎炎腎病症候群及腎病變，探其原因，可能為人口老化及藥物濫用的觀念盛行所致。本市 99 年底 65 歲以上老年人口數已達 23 萬人，老年人因身體機能衰退，抵抗力較弱易感染呼吸道方面疾病，且一旦發病其致死率亦較高，除平時維持健康飲食及規律運動增強自身抵抗力外，藉由疫苗的接種亦能提升免疫力以降低感染機會，並配合定期保健篩檢，以期及早發現疾病，掌握黃金治療時間。另藥物濫用是危害腎功能的重要因子，其中又以止痛劑及抗生素為最，肇因於民眾對此兩種藥物的迷思及依賴程度較高，甚而未經醫師處方逕亂服成藥或透過非法醫療管道使用違法藥物，更是推波助瀾之元兇。除對民眾進行衛教宣導，避免聽信不實醫藥傳言外，亦應積極建立與導正民眾就醫觀念，依循正當醫療管道，求助於合格的專業醫師與依照醫師處方服用藥物。

衛生局除持續辦理整合性預防保健篩檢，亦舉辦多場如減重活動及腎病防治宣導、銀髮族老人健康促進活動、健康體能講座及健走活動等，更規劃特定月份為例如糖尿病宣導月、口腔癌防治宣導月等進行重點教育，此外各社區心理衛生中心亦提供免費心理健康諮詢與輔導服務。希望藉由多項篩檢及宣導活動，改善與促進民眾生活習慣與認知，提高民眾心理健康及追求健康之意識，期能增進市民個人健康度，並進而改善整體社會健康環境。

表 1 主要死因統計

順位	死亡原因	99 年			98 年			粗死亡率 年增率(%)	順位 變化
		死亡人數	粗死亡率	占率	死亡人數	粗死亡率	順位		
	所有死亡原因	14,220	538.2	100.0	13,695	520.7		3.83	
1	惡性腫瘤	4,089	154.8	28.8	4,040	153.6	1	1.21	—
2	心臟疾病(高血壓 性疾病除外)	1,387	52.5	9.8	1,297	49.3	2	6.94	—
3	腦血管疾病	983	37.2	6.9	1,014	38.6	3	-3.06	—
4	糖尿病	863	32.7	6.1	839	31.9	4	2.86	—
5	事故傷害	727	27.5	5.1	757	28.8	5	-3.96	—
6	肺炎	688	26.0	4.8	601	22.9	6	14.48	—
7	慢性下呼吸道疾病	557	21.1	3.9	463	17.6	8	20.30	1△
8	慢性肝病及肝硬化	510	19.3	3.6	536	20.4	7	-4.85	1↓
9	腎炎、腎病症候群 及腎病變	462	17.5	3.2	412	15.7	9	12.14	—
10	高血壓性疾病	395	15.0	2.8	377	14.3	11	4.77	1△

資料來源：行政院衛生署

表 2 主要癌症死因統計

順位	死亡原因	99 年			98 年			粗死亡率 年增率(%)	順位 變化
		死亡人數	粗死亡率	占率	死亡人數	粗死亡率	順位		
	所有癌症死亡原因	4,089	154.8	100.0	4,040	153.6		1.21	
1	肝和肝內膽管癌	787	29.8	19.2	759	28.9	1	3.69	—
2	氣管、支氣管和肺 癌	756	28.6	18.5	726	27.6	2	4.13	—
3	結腸、直腸和肛門 癌	472	17.9	11.5	457	17.4	3	3.28	—
4	女性乳房癌	207	15.6	5.1	193	14.7	4	7.25	—
5	口腔癌	243	9.2	5.9	222	8.4	6	9.46	1△
6	胃癌	207	7.8	5.1	234	8.9	5	-11.54	1↓
7	前列腺(攝護腺)癌	93	7.1	2.3	91	6.9	7	2.20	—
8	食道癌	186	7.0	4.5	180	6.8	8	3.33	—
9	子宮頸及部位未明 示子宮癌	71	5.4	1.7	71	5.4	10	0.00	1△
10	胰臟癌	136	5.1	3.3	152	5.8	9	-10.53	1↓

資料來源：行政院衛生署

圖1 主要死因及癌症死因占率

