



主計處統計通報

第 97-011 號

97 年 11 月

臺中市 96 年十大死因

一、整體死亡率略微上升，惡性腫瘤續居十大死因之首

臺中市 96 年死亡人數為 4,917 人，較上年增加 299 人，粗死亡率為每十萬人口 468.2 人，較上年增加 23.6 人或 5.3%，如依世界衛生組織編布 2000 年世界人口結構調整計算，標準化死亡率為每十萬人口 461.3 人，較上年增加 8.9 人或 2.0%。

96 年十大死因死亡人數占總死亡人數七成四，惡性腫瘤居首，其餘依序為心臟性疾病、腦血管疾病、糖尿病、事故傷害、腎炎腎徵症候群及腎性病變、肺炎、慢性肝病及肝硬化、自殺及高血壓性疾病。與 95 年比較，心臟性疾病由第 5 位挺進第 2 位，慢性肝病及肝硬化前進 1 位，自殺後退 1 位。綜觀十大死因中除事故傷害與自殺，餘皆為慢性疾病，且多與缺乏運動及飲食不健康相關，顯示民眾生活習慣仍有改善空間。

在去除人口結構老化因素後，十大死因中標準化死亡率呈減少者有 3 項，分別為自殺(減 15.1%)、糖尿病(減 7.5%)及惡性腫瘤(減 3.1%)；餘皆呈增加，其中以心臟性疾病增 33.4%、慢性肝病及肝硬化增 30.8% 最多。

二、肝癌、肺癌續居主要癌症死因前二位

就癌症觀之，96 年癌症死亡人數為 1,498 人，占有所有死亡人數的 30.5%，平均每 5.8 小時就有一位市民因癌症死亡。粗死亡率為每十萬人口 142.6 人，與上年持平，標準化死亡率為每十萬人口 139.2 人，較上年降低 3.1%。

如依各癌症死亡率排序，其前 10 位依序為肺癌、肝癌、結腸直腸癌、女性乳癌、胃癌、攝護腺癌、口腔癌(含口咽及下咽)、子宮頸癌、胰臟癌、食道癌。與 95 年比較，前 5 名死因順序相同，攝護腺

癌及胰臟癌分別前進 2 及 1 名。

十大癌症標準化死亡率與上年相較，因現代人高脂飲食、少運動影響下，以結腸直腸癌增 11.8% 最多，另攝護腺癌、胰臟癌及肝癌亦呈增加，餘 6 項癌症則呈現下降。尤其衛生單位持續進行注意食物的保鮮、少吃醃製品及檳榔、婦女每年度子宮頸抹片檢查等衛教宣導，使胃癌、食道癌、口腔癌及子宮頸癌降幅最多。

三、促進個人健康與營造社區健康環境

衛生局為增進市民身心健康，持續辦理多種疾病免費篩檢，如子宮頸抹片、大腸直腸癌篩檢、乳癌篩檢、肝炎篩檢等活動，另亦有提供社區服務，協助民眾測量血壓、血糖、骨質疏鬆度等，此外各社區心理衛生中心也提供心理健康諮詢與輔導服務。希望藉由衛生政策及相關措施，協助民眾早期發現疾病，以掌握治療黃金時期，同時並透過宣導與教育，傳達市民有關個人健康促進及社區健康環境營造的概念，以期使本市能成為更樂活的城市。

表 1 主要死因統計

| 順位 | 死亡原因 | 96年 | | | 95年 | | | 順位 | 年增率(%) | |
|----|------------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|----|--------|--------|
| | | 死亡人數 | 粗死亡率 | 標準化死亡率 | 死亡人數 | 粗死亡率 | 標準化死亡率 | | 粗死亡率 | 標準化死亡率 |
| | 所有死亡原因 | 4,917 | 468.2 | 461.3 | 4,618 | 444.6 | 452.4 | | 5.3 | 2.0 |
| 1 | 惡性腫瘤 | 1,498 | 142.6 | 139.2 | 1,481 | 142.6 | 143.6 | 1 | 0.0 | -3.1 |
| 2 | 心臟性疾病 | 447 | 42.6 | 42.2 | 324 | 31.2 | 31.6 | 4 | 36.4 | 33.4 |
| 3 | 腦血管疾病 | 403 | 38.4 | 37.9 | 363 | 35.0 | 35.8 | 2 | 9.8 | 5.9 |
| 4 | 糖尿病 | 321 | 30.6 | 31.0 | 338 | 32.5 | 33.5 | 3 | -6.1 | -7.5 |
| 5 | 事故傷害 | 222 | 21.1 | 20.3 | 201 | 19.4 | 19.8 | 5 | 9.2 | 2.3 |
| 6 | 腎炎腎徵候群及腎性病 | 209 | 19.9 | 19.8 | 180 | 17.3 | 18.1 | 6 | 14.8 | 9.1 |
| 7 | 肺炎 | 175 | 16.7 | 16.1 | 158 | 15.2 | 15.7 | 7 | 9.5 | 2.8 |
| 8 | 慢性肝病及肝硬化 | 161 | 15.3 | 14.4 | 120 | 11.6 | 11.0 | 9 | 32.7 | 30.8 |
| 9 | 自殺 | 130 | 12.4 | 11.1 | 148 | 14.3 | 13.1 | 8 | -13.1 | -15.1 |
| 10 | 高血壓性疾病 | 96 | 9.1 | 8.9 | 76 | 7.3 | 7.5 | 10 | 24.9 | 18.9 |

表 2 主要癌症死因統計

| 順位 | 癌症死因 | 96年 | | | 95年 | | | 順位 | 年增率(%) | |
|----|-------------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|----|--------|--------|
| | | 死亡人數 | 粗死亡率 | 標準化死亡率 | 死亡人數 | 粗死亡率 | 標準化死亡率 | | 粗死亡率 | 標準化死亡率 |
| | 所有癌症死亡原因 | 1,498 | 142.6 | 139.2 | 1,481 | 142.6 | 143.6 | | 0.0 | -3.1 |
| 1 | 肺癌 | 276 | 26.3 | 25.9 | 270 | 26.0 | 26.9 | 1 | 1.1 | -3.6 |
| 2 | 肝癌 | 259 | 24.7 | 24.7 | 243 | 23.4 | 24.3 | 2 | 5.4 | 1.8 |
| 3 | 結腸直腸癌 | 194 | 18.5 | 18.4 | 174 | 16.8 | 16.5 | 3 | 10.3 | 11.8 |
| 4 | 女性乳癌 | 73 | 13.6 | 12.0 | 81 | 15.3 | 13.8 | 4 | -11.1 | -13.4 |
| 5 | 胃癌 | 82 | 7.8 | 7.5 | 111 | 10.7 | 10.8 | 5 | -26.9 | -30.7 |
| 6 | 攝護腺癌 | 38 | 7.4 | 6.9 | 32 | 6.3 | 6.4 | 8 | 17.7 | 9.0 |
| 7 | 口腔癌(含口咽及下咽) | 67 | 6.4 | 6.0 | 89 | 8.6 | 8.0 | 6 | -25.5 | -25.6 |
| 8 | 子宮頸癌 | 31 | 5.8 | 5.5 | 39 | 7.4 | 7.4 | 7 | -21.6 | -25.6 |
| 9 | 胰臟癌 | 59 | 5.6 | 5.3 | 51 | 4.9 | 4.9 | 10 | 14.4 | 8.4 |
| 10 | 食道癌 | 47 | 4.5 | 4.2 | 63 | 6.1 | 5.8 | 9 | -26.2 | -27.8 |

圖 1 主要死因及癌症死因占率

