



臺中市統計通報


第 110-01-01 號

癌症(惡性腫瘤)死因統計

110 年 1 月
衛生局
主計處

【提要】癌症(惡性腫瘤)自 71 年起，居國人死因之首位。108 年臺中市癌症死亡人數為 5,228 人，占總死亡人數 29.64%，較 107 年增 83 人(1.61%)；粗死亡率為每十萬人口 186.08 人，較 100 年增 24.47 人(15.14%)；標準化死亡率則為每十萬人口 121.81 人，較 100 年減 14.56 人(-10.68%)。

108 年臺中市
市民死亡人數計 1
萬 7,638 人，其中
癌症死亡人數為
5,228 人，占 29.64
%，較 107 年增
83 人 (1.61%)；
粗死亡率為每十
萬人口 186.08 人，
較 107 年略增 2.03



資料來源：衛生福利部統計處。

人(1.10%)，較 100 年則增 24.47 人(15.14%)，長期呈現上升趨勢；改依 2000 年 WHO 之世界標準人口結構調整後，癌症標準化死亡率為每十萬人口 121.81 人，較 107 年減 2.76 人(-2.22%)，較 100 年則減 14.56 人(-10.68%)，顯示我國衛生醫療保健持續進步。另，臺中市癌症死亡平均年齡為 68.5 歲，較 107 年增 0.4 歲；中位數為 69.0 歲，則增 1.0 歲。

若依性別觀察，108 年女性癌症標準化死亡率為每十萬人口 89.21 人，低於男性之 159.85 人；其中女性癌症標準化死亡率之前三位為女性乳癌、肺癌及結腸直腸癌，分別為每十萬人口 14.06 人、13.82 人及 11.82 人；男性則為肺癌、肝癌及結腸直腸癌，分別為每十萬人口 31.93 人、26.61 人及 19.54 人。

108 年臺中市市民主要癌症死因-按性別分

單位：人；人/十萬人

性別	癌症 (惡性腫瘤)	氣管、支氣 管和肺癌	肝和肝內膽 管癌	結腸、直腸 和肛門癌	口腔癌	食道癌	前列腺 (攝護腺)癌	胃癌	胰臟癌	非何杰金氏 淋巴瘤	白血病
死亡人數	3,180	636	533	385	327	214	167	157	143	94	76
標準化 死亡率	159.85	31.93	26.61	19.54	16.38	10.74	8.00	7.71	7.13	4.85	4.36
性別	癌症 (惡性腫瘤)	氣管、支氣 管和肺癌	女性乳癌	結腸、直腸 和肛門癌	肝和肝內膽 管癌	胰臟癌	胃癌	子宮頸及部 位未明示子 宮癌	卵巢癌	白血病	非何杰金氏 淋巴瘤
死亡人數	2,048	325	308	278	241	123	104	77	69	62	59
標準化 死亡率	89.21	13.82	14.06	11.82	10.11	5.14	4.29	3.42	3.27	2.75	2.45

資料來源：衛生福利部統計處。

附 註：1. 係以國際疾病傷害及死因分類標準第十版(ICD-10)進行死因統計。
2. 標準化死亡率係指去除人口老化因素影響，以2000年WHO之世界人口結構為標準調整後之比率。